



Origen genético: Ari X (X Belle de Fontenay Katahdin)

Criador (s): SFA - (Países Bajos)

Registro: Catálogo francesa (1954)

Tipo: La lista A,

Categoría: Consumo

de madurez: de mediano a principios de Early

caracteres descriptivos

Tubérculo: Largo ovalada, ojos muy fija, muy poco profundas, la piel de color amarillo claro, pálido carne amarilla.

Sprout: . Púrpura, cilíndrica, densa pilosidad

de la planta: Altura media, hábito semi-vertical, de tipo semi-frondosa.

Tallo: pigmentación débil, con alas desarrollados, lisos y ondulados.

Hoja: verde claro, poco dividida, abierta; folleto media, redondeada ovalada (I = 1,68); extremidad ampollas.

Floración: . No es muy abundante

la flor: . blanca, parcialmente pigmentada capullo de la flor

de la fruta: Muy raras.

caracteres culturales y el uso

Rendimiento: . 85% de Bintje

de evaluación: Proporción de tubérculos grandes: . De alta a muy alta

susceptibilidad a las enfermedades:

tizón de la hoja: . Susceptibles

al tizón del tubérculo: . Susceptibles

de verrugas: Negro. No atacado

Sarna común: . Bastante insensibles

Virus X : RAS; Virus a: RAS; poco sensible: Virus Y.

rollo de la hoja: bastante sensible.

nematodo RO 1-4: NTR

defectos internos del tubérculo: más bien poco susceptibles a las manchas de óxido, susceptibles de corazón hueco, puntos negros: NTR

Sensibilidad a la 'desprouting: . muy sensible

período de latencia: . mediana

calidad culinaria: Bueno para cocinar, culinario grupo B, ennegrecimiento después de la cocción: muy baja a cero, el color de alevines: de medio a muy oscuro.

contenido de materia seca: baja.

mantener la calidad: Medio.

características generales

Variedad dando tubérculos hermosa presentación en forma, regularidad y ojos muy superficiales. Ella le pide que se le da gran cuidado en la conservación y pre-germinación de las plantas.